



SUMMARIES

HOT TOPICS

Cabozantinib in pazienti con metastasi cerebrali (BM) non localmente pretrattate da carcinoma a cellule renali (RCC): Risultati dello studio multicentrico CABRAMET di fase II

Sylvie Negrier et al.

Department of Medical Oncology, Centre Léon Bérard, University of Lyon, Lyon, France

✔ Introduzione

- Nonostante i notevoli progressi nei trattamenti del RCC metastatico, i pazienti con BM continuano ad avere un esito negativo e sono stati per lo più esclusi dagli studi clinici.
- I trattamenti locali sul BM sono oggi lo standard.

✔ Metodi

- Sono stati inclusi pazienti adulti con RCC istologicamente comprovato e BM ≥ 5 mm (o > 8 mm se solitario) con almeno un trattamento non locale, < 3 trattamenti sistemici precedenti escluso cabozantinib, ECOG PS 0 o 1 e steroidi < 40 mg/die.
- L'endpoint primario era il tasso di sopravvivenza libera da progressione a 6 mesi (6m-BM-PFS) secondo i criteri RANO-BM modificati dalla revisione centrale.
- Gli endpoint secondari erano la risposta e la durata della risposta al BM, la risposta extracranica, la PFS, la sopravvivenza globale e la sicurezza. Per valutare l'endpoint principale erano necessari 25 pazienti valutabili.

✔ Risultati

- Sono stati inclusi 26 pazienti, 25 erano valutabili per l'endpoint primario e il tempo di follow-up mediano era di 39,8 mesi [5,9-49,7]. La PFS a 6m-BM è stata del 56,0% [unilaterale 95%CI 37,9-] (14/25 pts).
- La risposta al BM è stata una risposta parziale (PR) per il 61,5% (16/26) dei pazienti e la durata mediana della risposta non è stata raggiunta; il 66,7% dei pazienti era libero da eventi 24 mesi dopo la risposta al BM.
- La risposta extracranica è stata PR per il 38,5% (10/26). La PFS mediana è stata di 8,1 mesi [95%CI 4-11,9] e la PFS mediana del BM di 8,4 mesi [95%CI 5,4-NR].
- La sopravvivenza globale mediana è stata di 15,8 mesi [95%CI 9,7-35,0]. Non sono stati osservati nuovi segnali di sicurezza.

✔ Conclusioni

- Questo è il primo studio prospettico che valuta cabozantinib in pazienti affetti da RCC con BM non pretrattato localmente.
- Questi risultati confermano l'efficacia di cabozantinib sul BM precedentemente riportata in serie retrospettive.

Pts characteristics.

Pts number	N = 26
Median age (years) [range]	67 [44-86]
Gender: F / M, n	5 / 21
ECOG PS: 0 / 1, n	10 / 16
RCC: non-clear cell / clear cell, n	2 / 24
Prior nephrectomy : n	16
Number of BM: 1 / 2 / >3, n	9 / 7 / 10
Prior BM treatments: Overall/ Surgery/ Radiation, n	10 / 3 / 10
Prior systemic treatment: 0 / 1 / ≥ 2 , n	7 / 15 / 4
IMDC: Favorable / Intermediate / Poor, n	7 / 10 / 9